

NOTE VII.

DESCRIPTION D'UN CÉRAMBYCIDE DE SUMATRA,
APPARTENANT À UN GENRE NOUVEAU DE
LA TRIBU DES DISTÉNIDES.

PAR

J. W. van LANSBERGE.

Cladopalpus, gen. nov.

Mâle. — Tête horizontale. Palpes labiaux courts ; leur dernier article turbiniforme. Palpes maxillaires 5 fois plus longs que les labiaux, à article 2 très allongé, arqué, lisse, 3 transversal, 4 aussi long que 2, spongieux en dedans, émettant à la base un rameau spongieux, recourbé parallèlement à lui. Mandibules courtes, arquées, faiblement bifides au bout. Front concave. Yeux très gros, transversaux, assez rapprochés en dessus, fortement granulés, subéchancrés antérieurement. Antennes insérées en avant des yeux, près des mandibules, atteignant à peine le milieu des élytres, velues, à article 1 arqué, le plus grand de tous, 3—11 allant en diminuant, le dernier un peu plus long, subfusiforme. Prothorax étranglé au sommet et à la base, fortement tuberculé latéralement. Elytres déprimées, parallèles. Pattes assez robustes, les antérieures les plus courtes, les cuisses postérieures plus courtes que l'abdomen. Tarses postérieures à article 1 plus court que 2 et 3 réunis. Dernier segment abdominal transversal, échancré.

Cladopalpus Hageni, spec. nov.

Niger, nitidus, breviter pilosus; fronte brevi, excavata, inter antennis carinata; vertice punctato, inter oculos obsolete sulcato; thorace crebre punctulato, disco plano, lateribus bisinuato tuberculis magnis, acutis; elytris grosse seriatim punctatis, inter puncta iterum subtilius punctulatis, obsolete bicarinatis, apicibus rotundatis. — Long. 25—30 mm.

Noir, couleur de poix brillant, couvert en entier d'une courte pubescence grise, les tarsi fauves en dessous. Tête densément ponctuée, rétrécie en arrière des yeux, sillonnée longitudinalement au milieu, le front court, transversalement concave. Prothorax un peu moins densément ponctué, aplati sur le disque, fortement rétréci antérieurement, sinué avant et après le tubercule latéral. Ecusson arrondi postérieurement, concave, rugueux. Elytres planes, beaucoup plus larges que le prothorax, munies de rangées de gros points profonds, entre lesquels elles sont finement pointillées, et de deux côtes dont une près du bord extérieur et l'autre, également latérale, un peu plus haut; extrémité arrondie, à ponctuation bien moins forte.

Dédié au Dr. Hagen qui l'a envoyé au Musée de Leyde de Serdang (Sumatra). J'en possède un second exemplaire trouvé à Java. (Mont Ardjoeno). L'exemplaire de Serdang est brun clair, mais comme celui de Java est noir, il est clair que la couleur brune du premier n'est qu'occasionnelle.